n°. 102.

par M. Mirault chirurgien en chef de l'hopital d'Angers. —

Suittes facheuses d'un Squirre tres volumineux de la glande lacrimale, extirpation de la tumeur et du globe de L'oeil.

Le 14 du mois D'aoust 1749 Etienne Bodin fille âgée de 22 ans de la paroisse de St fort pres chateaugontier en Anjou, se presenta à L'hôtel dieu pour y être traitée d'une tumeur qu'elle portoit à L'oeil gauche. la cause externe de cette maladie dattoit depuis cinq ans qu'elle avoit eu l'oeil griffé par une poule qui lui vola a la figure; le globe de L'oeil ne fut point endomagé, il n'y eut que les parties adjacentes, dont elle parut guerie en peu de tems.

Six mois après cet accident elle commença a s'appercevoir d'une tumeur au petit angle qui par son accroissement insensible — comprimoit le globe et gênoit ses mouvements;

ARC 55 n° 30

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

pendant l'espace de deux ans le developpement se fit par continuation et au point que l'oeil chassé du coté du nez perdit ses fonctions deveint très douloureux et enfin creva. les humeurs s'étant evacuées par l'ouverture, les souffrances cesserent. alors les muscles du globe attirerent la coque des membranes au fond de l'orbite, et la tumeur occupa bientôt non seulement toute la baze de cette cavité, mais encore par la suitte du tems les paupieres forjettées en avant presentoient une tumeur du volume de la moitié d'une moijene pomme: la conjonctive boursouflée sortoit a travers les paupieres de l'epaisseur du doigt, ainsi que le represente le tableau de la maladie peinte quelques jours - avant l'operation.

j'emportai d'abord avec les ciseaux la saillie de la conjonctive qui tomboit sur la joüe, mais la portion de cette membrane qui du globe de l'œil se reflechit et tapisse la face interne de la paupiere superieure, poussée en devant et en bas

par la tumeur tenant de force cette paupiere developée, il me fut impossible de la relever. En consequence je la fendis perpendiculairement, dissequai les deux lambaux et me procurai ainsi la facilité d'aller detacher la glande dans la fosette du petit angle ou elle avoit commencé a se developper. cela fait, je detachai le reste avec facilité dont le pourtour inegalement bosselé n'etoit adherent que par du tissu cellulaire assez lâche. le moignon de L'œil resta au fonds de L'orbite, et je pansai en remplissant mollement la cavité, pour faire un soutient aux bords de la section de la paupiere maintenus raprochés par du taffetas d'angl-eterre, et prescrivis une saignée reiterée.

Deux jours aprés, a la levée du premier appareil, je vis avec etonnement que le moignon s'etoit fort gonflé, les jours suivants encore davantage, il etoit fort douloureux et remplissoit la majeure partie de L'orbite.

ARC 55
n°-30

je n'attendis pas audela du sixieme jour j'en fis l'extirpation entiere, et depuis cette epoque le traitement ne presenta rien de particulier; touts mes soins se bornerent a tenir raprochées et en contact les levres de la paupiere pour favoriser leur reunion qui eut lieu entierement sauf le cartilage tarse. cette fille fut en etat de sortir de l'hôtel dieu le 1er 9bre, on verra l'etat actuel de l'oeil que j'ai fait peindre le 13 Xbre, la tumeur est representée renversée son pedicule en haut.

On voit par cette observation que la glande lacrimale a pris un developpement quon peut evaluer a vingt cinq fois en sus de son volume naturel, ce qui m'a paru assez extraordinaire, ainsi que la rupture du globe a la suitte pour vous en faire part. cette fille jouit maintenant de la santé la plus fleurie, il y auroit même possibilité quelle portat un oeil d'email, mais il n'y a plus d'humeur lacrimale pour l'humecter.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE